


¿Sabes si tu perro sufre de IBD/IGOR?

Si nota más de cuatro síntomas en su perro, le recomendamos que complete el cuestionario gratuito en línea:

Consulte gratis
online en
www.ibd-hund.de

- Antojos • Pérdida de peso • Ansiedad • Necesidad dolorosa de defecar
- Inaccesibilidad • Ruidos intestinales notablemente fuertes • Nerviosismo
- Diarrea recurrente • Ingestión de heces/hierba • Mayor inquietud, a menudo por la noche. • Heces o diarrea con sangre • Necesidad nocturna de defecar.
- Heces con moco o con una capa de moco • Predominantemente pequeñas cantidades de heces. • A veces, secreción explosiva sin grandes cantidades de heces • Agresión.
 - Incontinencia/goteo nocturno • Morderse las patas de forma compulsiva.
 - Acidez • Lamer la alfombra • Convulsiones epileptiformes • Síndrome de PICA
 - Crisis recurrentes que aumentan gradualmente con el tiempo (años)



Puede encontrar ayuda aquí:

Más información en www.ibd-hund.de
y www.lupovet-iberica.es

Piezas específicas del rompecabezas para el tratamiento de la canIBD

Alimento con la gama IBDerma:

IBDerma Hyposens
(con IGOR recommendable pellet mini).
IBDerma HappyChi
IBDerma VeggieSens
IBDerma Tapiovo Mini
(con agua)

Suplementos Lupovet:

IGORReflux
Inu-Tryptophan
Lup-Enterol
PropionArte
Boswellia-Serrata-65% BA

Comida adicional

chucrut fresco
costillas de oveja
vinagre
remolacha
achicoria
kéfir (u otros productos lácticos)
queso Limburger e hígado
pepinillos encurtidos
sopa de moro

Medico

Visita
veterinaria

Mental/ Social:

Paz y equilibrio
Ambiente estable
Confianza y libertad

Recompensa/ Aceptación:

Snacks apropiados
de Lupovet
IBDerma Tapiovo Mini
Latas de pura carne
O en Bolsas frescas
de Lupovet

Plan de tratamiento personalizado para canIBD

Alimento completo IBDerma (Hyposens, Happy Chi , VeggieSens, Tapiovo)

(según edad/actividad: 1,2-1,5-2,8 % por masa corporal, repartido en 3-4 raciones diarias), diluido con 2-3 veces la cantidad de agua tibia o caldo de verduras.

Suplemento*	Dosis:	Peso del perro:		
		hasta 10kg	10-30kg	más de 30kg
IGORReflux	de 3 a 5 tomas x día	Aprox. 1,5gr	De 2 - 4gr	4 - 6gr
Alternativas:				
IGORReflux-Maxi-Kaps	de 3 a 5 tomas x día	½ Cáps.	De 1/2 a 1y 1/4	De 1 y ½ hasta 3
IGORvegan-Kaps	de 3 a 5 tomas x día	1-3 Cáps.	3 - 9 Cáps.	9-12 Cáps.
IGORReflux Peletten	de 3 a 5 tomas x día	Aprox. 1,5gr	De 2 - 4gr	4 - 6gr
IGORzym	de 3 a 5 tomas x día	Aprox. 1,5gr	De 2 - 4gr	4 - 6gr
Añadir a la comida, idealmente antes de las comidas y por la noche antes de acostarse, o incluso por la noche si es necesario. Sirvalo solo como premio, mezclado con chucrut/ensalada de col fresca o con queso rojo curado para untar (p. ej., Limburger, Münster, etc.), al gusto.				
Inu-Triptófano 350mg (preferiblemente separado de las comidas principales)	1 o 2 tomas al día	1 Cáps. x día	De 1 a 2 Cáps.	1Cáps.
Lup-Enterol	2-3x veces al día	1 cdt. rasa	1 cdt.	1 cda.
Boswellia-Serrata-65% BA	3 veces al día	½-1Cáps.	1-2 Cáps.	2-3Cáps.
PropionArte	2 veces al día	½ Cáps.	½-2 Cáps.	2-3Cáps.

* Nota importante: Cada perro es diferente, por lo que los suplementos también deben ajustarse individualmente.
Lo mínimo posible y lo máximo necesario. Si el efecto es bueno, se puede reducir la cantidad de cualquier suplemento.

Medicación (según la situación, tras consejo veterinario)

Budesonida 3mg cápsulas duras (450 globulos = 1½ cápsula)	1 vez por la mañana	60-150 globulos.	Aprox. ½Cáps.	Aprox. ½-1Cáps.
--	---------------------	------------------	---------------	-----------------

Sulfasalazina 500mg	3 veces al día	1/12 tabl.	¼ tab.	¼- ½ tab.
----------------------------	----------------	------------	--------	-----------

(si es necesario, triturar) Nota: En poco menos del 1 % de los casos, existe riesgo de queratoconjuntivitis seca (KCS) inicialmente reversible. Esto sucede a menudo, si se presenta, dentro de las primeras 3 semanas tras la administración de sulfasalazina. Ajuste o suspenda la dosis si es necesario.

Mas

Aperitivos y snacks:

Cabra criada en libertad (en bolsas frescas, o latas) para aumentar la aceptación. Máximo 10 % de la ración diaria total, IBDerma Tapiovo Mini, snacks especiales para IBD/IGOR de LupoVet

Comida adicional

Chucrut crudo	(col fermentada) hasta un 1 % del peso corporal y de vez en cuando, ¡Fresco! para conservar los valiosos componentes.
Costillas de oveja	(con músculo/cartílago, frescas, esterilizadas brevemente con agua hirviendo por razones higiénicas).
Vinagre	Alimente a su perro con hasta 3 cucharadas de vinagre al día.
Remolacha	directamente del frasco, incluido el jugo.
Chicory (achicoria)	al vapor o cruda, hasta el 1% del peso corporal
Kéfir	Pruebe productos con ácido láctico, incluido el yogur natural, hasta 3 cucharadas al día.
Limburger	Administración repetida de quesos de untar rojos, como el queso Limburger/Münster curado (2 x 5 g de forma continua por cada 10 kg de peso corporal al día, para 30-40 kg (2 x 10 g).
Liver (Hígado de res)	El hígado es una excelente fuente de vitamina B. Un trocito de vez en cuando, rociándolo brevemente con agua hirviendo por razones de higiénicas.
Pepinillos encurtidos	entre comidas como fuente de lactobacilos/lactato.
Sopa de Moro	(sopa de zanahoria) algunas cucharadas.

