

# Anche il tuo cane soffre di IBD/IGOR?

Se noti più di quattro sintomi nel tuo cane, ti consigliamo di compilare il questionario online gratuito

Test online  
gratuito su  
[www.ibd-hund.de](http://www.ibd-hund.de)

- Fame intensa • Perdita di peso • Ansia • Stimolo doloroso a defecare
- Inaccessibilità • Rumori intestinali notevolmente forti • Risposta di sussulto
- Diarrea ricorrente • Coprofagia/mangiare erba • Aumento dell'irrequietezza, anche notturna • Feci o diarrea con sangue • Stimolo notturno a defecare
- Feci con muco o rivestimento mucoso • Volume di feci prevalentemente ridotto
- A volte defecazione esplosiva senza un volume elevato • Aggressività
- Incontinenza/gocciolamento notturno • Masticazione maniacale delle proprie gambe
- Bruciore di stomaco • Leccare il tappeto • Crisi epilettiformi • Sindrome PICA
- Attacchi ricorrenti che aumentano gradualmente di intensità nel tempo (anni)



L'assistenza è disponibile qui:

Scopri di più su [www.ibd-hund.de](http://www.ibd-hund.de)  
e [www.lupovet.de](http://www.lupovet.de).

Yes, we canIBD!

## Pezzi chiave del puzzle per il trattamento della canIBD

### Feed da Linea IBDerma

IBDerma Hyposens  
(in miniform presso IGOR)  
IBDerma HappyChi  
IBDerma VeggieSens  
IBDerma Tapiovo Mini  
(tutto con acqua)

### LupoVet supplemento

IGORreflux IGORzym  
& IGORvegan  
Inu-Tryptophan  
Lup-Enterol  
PropionArte  
Boswellia-Serrata-65% BA

### Alimenti importanti

Crauti / Insalata di cavolo  
Tè o semi di finocchio / cumino  
Aceto / Cetriolini sottaceto  
Barbabietola / Cicoria / Carciofo  
Formaggio: Munster / Limburger  
Zuppa Moro  
Prodotti a base di acido lattico  
come lo yogurt  
Costolette di maiale / Fegato

### Medico

Veterinario  
Consultazione

### Psiche/ Sociale

Pace e equilibrio  
Ambiente stabile  
Fiducia e  
spazio aperto

### Ricompensa/ accettazione

Snack adatti da LupoVet  
IBDerma Tapiovo Mini  
Carni di pura carne/  
Sacchetti  
di freschezza di LupoVet

# Piano di trattamento personalizzabile per canIBD

## Mangime completo IBDerma (Hyposens, Happy Chi, VeggieSens, TapiOvo)

(A seconda del peso target del cane) 1,2/1,5/2% del peso target, s (distribuito 3-4 volte al giorno), versato sopra con 2-3 volte la quantità di acqua tiepida/brodo vegetale.

### Peso del cane:

Integratori*	Dosaggio:	fino a 10kg	10-30kg	oltre 30kg
IGOReflux or IGORvegan o alternative:	3-5 volte al giorno	circa 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
IGORvegan capsules	3-5 volte al giorno	1 capsula	1-3 capsule.	9 -12 capsule.
IGORMaxi capsules	3-5 volte al giorno		1 capsula	1-2 capsule.
IGOReflux peletts	3-5 volte al giorno	up to 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
IGORzym	3-5 volte al giorno	up to 1,5g	2 - 4g	4 - 6g

Idealmente, da somministrare prima dei pasti o direttamente mescolato al cibo, e la sera prima di coricarsi, o anche durante la notte se necessario. Servire come spuntino da solo, mescolato con crauti freschi/insalata di cavolo, o in un formaggio cremoso rosso stagionato (ad esempio, Limburger, Münster, ecc.), a piacere.

**Inu-Tryptophan** due volte al giorno ½ capsula ½-1capsula 1 capsula  
(preferibilmente al di fuori dei pasti principali)

**Lup-Enterol** 2-3 volte al giorno 1 c.na raso 1 c.na 1 c.

**Boswellia-Serrata-65% BA** 3 volte al giorno ½-1 capsula 1-2 capsule. 2-3 capsule.

**PropionArte** due volte al giorno ½-1 capsula 1-2 capsule 2-3 capsule

\*\* Nota importante: ogni cane è diverso, pertanto anche gli integratori devono essere adattati individualmente.

### Farmaci (secondo necessità, dopo consultazione veterinaria)

**Budesonid 3mg capsule rigide** 1 volta al mattino 60 - 150glob. ~ ½capsula rigida ~ ½-1capsula rigida  
(= 450 globuli)

**Sulfasalazin 500mg** 3 volte al giorno 1/12tab. 1/6tab. 1/4- 1/2tab.

(frantumare se necessario) Nota: in circa l'1% dei casi, esiste il rischio di sindrome dell'occhio secco (KCS) inizialmente reversibile. Ciò si verifica, se presente, entro le prime 3 settimane dalla somministrazione di sulfasalazina. Se necessario, aggiustare la dose o interrompere il trattamento.

## Ulteriore

### Antipast e snack

**Freiland-Ziege Capra** allevata all'aperto (buste fresche, lattine) per aumentarne l'accettabilità, max. 10% della razione giornaliera totale, IBDerma TapiOvo Mini, snack speciali per IBD/IGOR di LupoVet

### Aggiuntivo

**Crauti o insalata di cavolo, freschi** (dal reparto refrigerato), aumentando gradualmente fino all'1% del peso corporeo  
**Tè di finocchio, anche tisana di cumino** o semi di finocchio o cumino.

**Aceto:** cani di grossa taglia fino a 3 x 2 cucchiai, cani di piccola taglia circa 3 x 1 cucchiaino al giorno

**Barbabietola**, direttamente dal barattolo, succo incluso, fino all'1% del peso corporeo

**Cicoria, cotta al vapore o cruda**, fino all'1% del peso corporeo

**Formaggio (formaggio rosso)** 2 x 5 g per 10 kg di peso corporeo al giorno, per 30-40 kg 2 x 10 g

**Indivia**, cotta al vapore o cruda, fino allo 0,5% del peso corporeo

**Fegato** (di pecora o manzo): di tanto in tanto

**Zuppa di Moro** (zuppa di carote secondo E. Moro) a cucchiainate

**Articook**, cotta al vapore o cruda, fino allo 0,5% del peso corporeo

**Podagraria / Cavolo riccio** fino allo 0,5% del peso corporeo

**Sottaceti** fino allo 0,5% del peso corporeo

**Latticini fermentati: Yogurt naturale, kefir**, ecc. fino a 3 cucchiaini al giorno

**Costolette di pecora o capra:** di tanto in tanto



LupoVet GmbH  
-veterinary diets-  
Haltinger Str. 1  
D-79379 Müllheim/Schwarzwald  
+ 49 7631 936820  
info@lupovet.de  
www.lupovet.de