

Czy także Twój pies cierpi na IBD/IGOR?

Jeśli zauważysz u swojego psa więcej niż cztery objawy, zalecamy wypełnienie bezpłatnej ankiety online:

Bezpłatna
ankieta
online dostępna
na www.ibd.vet

- Zachcianki jedzeniowe • Utrata masy ciała • Niedostępność psa (np. chowanie się pod meblami) • Głośnie burczenie w jelitach • Zjadanie odchodów/trawy • Stolec ze śluzem lub w otocze śluzowej • Biegunka/stolec z krwią • Zwiększony niepokój, również w nocy • Łęklliwość • Wrażenie przestraszonego psa • Młaskanie/odbijanie
- Bolesna potrzeba wypróżnienia • Agresywność wobec obcych • Nawracająca biegunka
- Przeważnie małe ilości kału • Czasami gwałtowne wypróżnienia, bez dużej ilości stolca
 - Nocna potrzeba wypróżnienia • Nocne nietrzymanie moczu/popuszczanie
- Maniakalne gryzienie własnych nóg/łap • Lizanie dywanu • Napady padaczkowe
- Zespół PICA • Nawracające ataki, które stopniowo nasilają się z czasem (latami)



Pomoc dostępna jest tutaj:

Dowiedz się więcej na stronach
www.ibd.vet i www.lupovet.pl

Yes, we canIBD!

Elementy układanki stanowiącej leczenie IBD

Karma z linii IBDerma

(zalewana wodą)

IBDerma Hyposens

(w przypadku IGOR dostępna również w małym granulacie: wersja Mini)

IBDerma HappyChi

IBDerma VeggieSens

IBDerma Tapiovo Mini

Suplementy od LupoVet

IGOReflux & IGORvegan

IGORzym

Inu-Tryptophan

Lup-Enterol

PropionArte

Boswellia-Serrata-65% BA

Ważne dodatki żywniowe:

Kiszona kapusta

Baranina, wątróbka wołowa

Ocet jabłkowy

Buraki

Cykorcia

Kefir

(lub inne produkty z kwasem mlekowym)

Ser Limburski

Ogórki kiszzone

Zupa z marchwi

Leki

Konsultacja
weterynaryjna

Psychika/ Socjalizacja

Spokój i równowaga

Stabilne środowisko

Zaufanie i wolność

Nagrody/Akcepto- wane dodatki

Przekąski od LupoVet
dedykowane IBD/IGOR
IBDerma Tapiovo Mini
Konserwy/saszetki ze
świeżym mięsem
od LupoVet

Plan leczenia IBD



Pełnoporcjowa karma z serii IBDerma (Hyposens, HappyChi, VeggieSens, Tapiovo Mini),

(w zależności od różnicy w docelowej masie ciała: 1,2-1,5-2% (docelowej masy ciała), podzielona na 3-4 posiłki dziennie i zalana 2-3-krotnie większą ilością letniej wody/bulionu warzywnego.

Suplement*	Waga psa:			
	Dawkowanie:	do 10kg	10-30kg	powyżej 30kg
IGOReflux lub IGORvegan	3-5x dziennie	ok1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Zamiennie				
IGOR veganKaps	3-5x dziennie	1 kaps.	1-3 kaps.	3-6 kaps.
IGORMaxi-Kaps	3-5x dziennie		1 kaps.	1-2 kaps.
IGOReflux Peletten	3-5x dziennie	do1,5g	2 - 4g	4 - 6g
IGORzym	3-5x dziennie	do 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Można dodać do jedzenia, najlepiej podać przed posiłkami i wieczorem przed snem, a w razie potrzeby w ciągu dnia. Podawaj samodzielnie lub jako przekąskę, wymieszaną ze świeżą kiszoną kapustą lub z dojrzałym czerwonym serem (np. Limburger, Münster itp.) wedle uznania.				
Inu-Tryptophan	2x dziennie	½ kaps.	½-1 kaps.	1 kaps.
(jeśli to możliwe, poza głównymi posiłkami)				
Lup-Enterol	2-3x dziennie	1 pł. łyż.	1 łyż.	1 łyż. stoł.
Boswellia-Serrata-65% BA	3x dziennie	½-1 kaps.	1-2 kaps.	2-3 kaps.
PropionArte	2x dziennie	½-1 kaps.	1-2 kaps.	2-3 kaps.

*Ważna uwaga: każdy pies jest inny, dlatego suplementy powinny być dostosowane indywidualnie.

Leki (w zależności od sytuacji, po konsultacji z lekarzem weterynarii):

Budezonid* 3mg	1x rano	0,4-1mg	ok. 1/2 kaps.	ok. 1/2-1 kaps.
twarda kapsułka				
Sulfasalazyna* 500mg	3x dziennie	½2tabl.	½6tabl.	¼- ½tabl.

(w razie potrzeby zmielić)

* substancja czynna

Uwaga: w nieco poniżej 1% przypadków istnieje ryzyko, początkowo odwracalnego KCS (z lac. keratoconjunctivitis sicca - suchego zapalenia rogówki i spojówki). Występuje ono, o ile w ogóle, w ciągu pierwszych 3 tygodni po podaniu sulfasalazyny. W razie potrzeby należy dostosować dawkę lub przerwać leczenie.

Więcej

Przystawki i przekąski

Koza z wolnego wybiegu (saszetki, puszki ze świeżego mięsa) dla zwiększenia akceptacji posiłków, maks. 10% całkowitej dziennej racji żywnościowej, IBDerma Tapiovo Mini, specjalne przekąski od LupoVet dedykowane IBD/IGOR.

Zawsze świeże: Ważne dodatki żywieniowe

Kapusta kiszoną	do 1% masy ciała
Żeberka baranie lub kozie	żeberka z mięśniami/chrząstkami, świeże, krótko zdezynfekowane wrzątkiem (od czasu do czasu)
Ocet jabłkowy	podawaj psu do 3 razy dziennie po 1 łyżeczce octu
Buraki	ze stołka z sokiem
Cykoria	gotowane na parze lub surowa, do 1% masy ciała
Kefir	wypróbuj produkty zawierające kwas mlekowy, a także jogurt naturalny (jeśli pies ma problem z wołowiną, używaj produktów zawierających kwas mlekowy z baraniny lub kozy), do 3 łyżeczek dziennie
Limburger	podawaj sery typu Limburger/Münster 2x dziennie (5g) na każde 10kg masy ciała, przy psach o wadze 30-40kg (2x dziennie po 10g)
Wątróbka wołowa	wątróbka (barania lub wołowa) jest doskonałym źródłem witaminy B, podawaj ją od czasu do czasu, zalewając uprzednio gorącą wodą ze względów higienicznych
Ogórki kiszone	jako źródło bakterii kwasu mlekowego/mleczanu
Zupa z marchwi	między posiłkami po kilka łyżek

PRZETESTOWANE
1000 RAZY!
PO PROSTU DZIAŁA

